




STUDIO DENTISTICO
HAZEN

Via Manin, 18/1 - 31046 Oderzo (TV) - Tel. +39 0422 710391
email: studio@hazen.it - www.hazen.it



CRICKET



DIAMO UN VOTO ALLA SALUTE
DELLE TUE GENGIVE

STUDIO DENTISTICO
HAZEN

DIAMO UN VOTO ALLA SALUTE DELLE TUE GENGIVE

Le misuriamo, stabiliamo il grado di infiammazione, verifichiamo alcuni indicatori utili ad una corretta valutazione e diamo il nostro voto. Le misurazioni sono stabilite in numeri per le 6 aree della dentizione:

- i molari superiori di destra
- gli incisivi superiori
- i molari superiori di sinistra
- i molari inferiori di sinistra
- gli incisivi inferiori
- i molari inferiori di destra



0 Le sue gengive sono sane: nessun problema.

1 Le sue gengive sono leggermente infiammate e sanguinano durante la misurazione. Siamo in presenza di una gengivite.

2 Oltre alla gengivite, è stato trovato anche del tartaro.

3- La gengivite si è aggravata e ha toccato la parte superiore dell'osso. Siamo in presenza di una parodontite iniziale.

3+ Parliamo di parodontite avanzata con perdita di osso dove verifichiamo l'esposizione della radice del dente.

4 La parodontite si è diffusa in direzione dell'apice dei denti. Parliamo di perdita di osso che può causare mobilità e perdita dei denti.

Nome: _____

Data: _____

	MOLARE DESTRO	INCISIVO	MOLARE SINISTRO
SOPRA			
SOTTO			

COME SI FORMA L'INFIAMMAZIONE GENGIVALE?

La causa è la placca dentale. La placca è lo strato bianco morbido che si forma in poche ore e si attacca alla superficie dei suoi denti. La placca contiene batteri e questi possono causare un'infiammazione se non vengono rimossi entro 24 ore. La placca che rimane attaccata a lungo, indurisce e si trasforma in tartaro causando il processo infiammatorio della gengiva che poi coinvolge l'osso e lo infiamma. Questa si chiama parodontite (n° 3 e 4).

PERCHÈ LEI HA LA PARODONTITE?

In tante persone con gengivite si sviluppa anche la parodontite. Accade soprattutto nel caso di insufficiente igiene orale, in combinazione con una predisposizione alla parodontite. Non è ancora del tutto chiaro da cosa derivi questa predisposizione, ma si ritiene sia legata a fattori genetici, a fumo, stress, alimentazione e a particolari condizioni di salute. È stato dimostrato che uno dei maggiori fattori di rischio per l'insorgenza della parodontite è il fumo, che inoltre riduce gli esiti positivi della cura. Una corretta salute orale consiste nello spazzolare accuratamente almeno 2 volte al giorno la dentizione (mattina e sera), in combinazione con una corretta pulizia degli spazi interdentali. Questo è necessario per rimuovere la placca dentale che contiene i batteri.

LA VISITA PARODONTALE

Quando la visita iniziale rileva una votazione di 3 o 4, significa che la sua bocca necessita di essere esaminata più a fondo per inquadrare con accuratezza la gravità della situazione. Tutti i dati che possano dare un aiuto vengono rilevati, in particolare si effettuano esami radiografici, molto importanti, per definire un quadro esatto della situazione. Dopo avere esaminato tutti i dati vengono discusse le possibilità di trattamento.

IMPIANTI

Sempre più persone hanno impianti in bocca. Naturalmente è consigliabile inserire impianti solo in una bocca sana e, successivamente, è molto importante controllare le gengive e l'osso regolarmente per prevenire la presenza di infiammazioni. Il processo infiammatorio attorno agli impianti che manifesta anche perdita di osso, si chiama peri-implantite.

IL TRATTAMENTO

Il trattamento per la valutazione 1 consiste nella rimozione della placca e nell'istruzione per una corretta igiene orale. A seguito di una valutazione 2 viene inoltre rimosso il tartaro. In caso di valutazione 3-, 3+ e 4, il tartaro viene localizzato più profondamente sotto la gengiva e per questo è probabile siano necessari più appuntamenti per la sua completa rimozione. A volte per ridurre sensibilità durante il trattamento, si consiglia di effettuare un'anestesia locale.

Dopo il trattamento può insorgere una temporanea ipersensibilità dei colletti dei denti.

Dopo qualche mese viene rivalutato il risultato raggiunto, in alcuni casi si riterrà necessaria una correzione chirurgica (valutazione 4).

Il trattamento della parodontite richiede tanto tempo e visto che servono più sedute è più costoso rispetto a un trattamento di igiene e detartrasi.

L'infiammazione guarisce quindi grazie alla combinazione di una corretta igiene orale e una accurata terapia professionale, la gengiva si attacca di nuovo alla superficie dei denti e non sanguina più al tatto.